



- Légende :**
- Limites du site Natura 2000
 - Limite des zones tampon (1 km, 500 m, 50 m)
 - Sensibilité très forte
 - Sensibilité forte
 - Sensibilité moyenne



Carte des sensibilités de la boucle de Jablines
ZONE DE PROTECTION SPECIALE FR1112003 "Les Boucles de la Marne"

Source des données : DRIEE Ile-de-France, AEV Ile-de-France, Ornithologues bénévoles des Boucles de la Marne.
 Fond cartographique numérique : BD Scan 25© IGN

Conception - réalisation : DDT 77/SEPR/PFCPMN, AEV Ile-de-France
 Date : Décembre 2012 Échelle : 1/1500



Secteurs de la boucle de Jablines

Secteurs	Sensibilité du secteur	Espèces d'intérêt communautaire présentes	Observations
<p align="center">J1 <i>Secteur de la partie sud est de la boucle en Forêt Régionale des Vallières</i></p>	Forte	Bondrée apivore	Espèce dont la reproduction est incertaine dans le site Natura 2000 mais pour laquelle ce secteur constitue une aire de reproduction potentielle.
		Pic noir	Ce secteur constitue un habitat potentiel pour l'espèce. Risque pour la reproduction éventuelle en cas de déboisement de la zone. A cet endroit, le risque de déboisement est faible (forêt soumise), mais certaines coupes soumises à EIN (dans le cadre de l'aménagement forestier) pourraient perturber un couple potentiel.
		Milan noir	Espèce rare en Ile-de-France où l'on trouve peu de couples. Le Milan noir utilise ce secteur pour se reproduire. L'espèce y a niché en 2009.
<p align="center">J2 <i>Secteur du sud de la boucle en Forêt Régionale des Vallières</i></p> <p align="center">J3 <i>Secteur de la partie ouest de la boucle, en Forêt Régionale des Vallières</i></p> <p align="center">J4 <i>Secteur de la partie ouest de la boucle, en Forêt Régionale des Vallières</i></p>	Moyenne	Milan noir	Espèce rare en Ile-de-France, peu de couples. Ces secteurs constituent des habitats favorables pour ce rapace.
		Pic noir	Ces secteurs constituent des habitats potentiels (J2) ou susceptibles de devenir favorables (J3 et J4) pour l'espèce. Risque pour la reproduction éventuelle en cas de déboisement de la zone. Le risque de déboisement est faible à cet endroit (forêt soumise), mais certaines coupes soumises à EIN (dans le cadre de l'aménagement forestier) pourraient perturber l'éventuel couple potentiel.
		Bondrée apivore	Espèce dont la reproduction est incertaine dans le site Natura 2000 mais pour laquelle ces secteurs constituent des aires de reproduction potentielles.
<p align="center">J5 <i>Secteur de la partie ouest de la boucle, en Forêt Régionale des Vallières</i></p>	Moyenne	Bondrée apivore	Espèce dont la reproduction est incertaine dans la ZPS mais pour laquelle ce secteur constitue une aire de reproduction potentielle. De plus, ce secteur est un milieu ouvert favorable à l'alimentation de la bondrée.
<p align="center">J6 <i>La Marne et ses berges, à l'intérieur du périmètre Natura 2000</i></p> <p align="center">J7 <i>La Marne et ses berges en zone tampon</i></p>	Moyenne	Martin-Pêcheur	Espèce non menacée en France, assez rare en Ile-de-France. Son état est favorable dans le site Natura 2000. Ces secteurs constituent des habitats potentiels pour cette espèce.
		Sterne pierregarin	Secteur utilisé comme aire d'alimentation par l'espèce. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage.
<p align="center">J8 <i>Secteurs situés dans la partie est de la boucle : un au nord lieu-dit « Bois des Vignes », deux au sud à proximité du plan d'eau « le Paradis »</i></p> <p align="center">J9 <i>Secteur au sud est de la boucle, en zone tampon</i></p>	Très forte	Edicnème criard	Espèce assez rare relativement localisée en Ile-de-France, qui utilise ces secteurs pour la nidification. Enjeu très important.
<p align="center">J10 <i>Plan d'eau de la partie sud de la boucle, à proximité de la Marne</i></p>	Forte	Butor étoilé	Espèce hivernante rare en Ile-de-France, disparue en tant que nicheur dans la région. Ce secteur est un habitat potentiel pour l'espèce.
		Blongios nain	Espèces à valeur patrimoniale importante et rare en Ile-de-France. Ce secteur est un habitat potentiel pour l'espèce.

<p>J11 <i>Plan d'eau de la partie sud est de la boucle, au niveau des sablières</i></p> <p>J13 <i>Roselières bordant la partie sud du plan d'eau de la base de loisir de Jablines-Annet et étang au nord est de la base de loisir</i></p>	Très forte	Butor étoilé	Espèce hivernant rare en Ile-de-France, disparue en tant que nicheur dans la région. Ces secteurs constituent des habitats potentiels pour l'espèce qui y est observée en période d'hivernage.
		Blongios nain	Espèce à valeur patrimoniale importante et rare en Ile-de-France qui utilise ces secteurs pour nidifier.
<p>J12 <i>Roselières bordant le plan d'eau du centre de la boucle</i></p>	Très forte	Blongios nain	Espèces à valeur patrimoniale importante et rare en Ile-de-France pour laquelle ce secteur de roselières constitue un habitat favorable.
		Butor étoilé	Espèce hivernante rare en Ile-de-France, disparue en tant que nicheur dans la région. Ce secteur représente un habitat potentiel pour elle. Le Butor étoilé y est observé en période d'hivernage.
		Gorgebleue à miroir	Espèce à valeur patrimoniale forte pour laquelle ce secteur constitue un habitat favorable. Le site des Boucles de la Marne est le seul site Natura 2000 abritant une population francilienne.
<p>J14 <i>Plan d'eau dans le nord de la boucle</i></p>	Très forte	Sterne pierregarin	Espèces à forte valeur patrimoniale dont les habitats de reproduction sont peu représentés en Ile-de-France et pour lesquelles la nidification est avérée sur ce secteur.
		Mouette mélanocéphale	
<p>J15 <i>Plans d'eau de la partie est de la boucle</i></p>	Forte	Sterne pierregarin	Espèces à forte valeur patrimoniale dont les habitats de reproduction sont peu représentés en Ile-de-France et pour lesquelles ces plans d'eau constituent un habitat favorable.
		Mouette mélanocéphale	
<p>J16 <i>Roselières entre l'étang J13 et J14, partie nord est de la boucle</i></p>	Forte	Gorgebleue à miroir	Espèce à valeur patrimoniale forte pour laquelle ce secteur constitue un habitat potentiel. Le site des Boucles de la Marne est le seul site Natura 2000 abritant une population francilienne.
<p>J17 <i>Secteur de la partie est de la boucle, au nord du « Marais de Croupeton »</i></p>	Forte	Œdicnème criard	Espèce assez rare relativement localisée en Ile-de-France. L'œdicnème criard utilise ce secteur comme aire d'alimentation. Les enjeux sont moins grands que sur un secteur constituant une zone de nidification potentielle ou avérée.
		Pie-grièche écorcheur	Assez rare et quasi menacée en Ile-de-France, cette espèce a besoin de zones de haies pour se nourrir comme celles que l'on trouve dans ce secteur où l'espèce a été observée avant 2009.
<p>J18 <i>Secteur de la partie est de la boucle, au nord du « Marais de Croupeton »</i></p>	Moyenne	Bondrée apivore	Espèce dont la reproduction est incertaine dans le site Natura 2000 mais pour laquelle ce secteur constitue une aire de reproduction potentielle.
		Milan noir	Espèce rare en Ile-de-France, peu de couples. Ce secteur est un habitat favorable pour ce rapace.
<p>J19 <i>Secteurs situés au nord et au sud dans la partie est de la boucle</i></p>	Forte	Pie-grièche écorcheur	Assez rare et quasi menacée en Ile-de-France, cette espèce a besoin de zones de haies pour se nourrir comme celles que l'on trouve dans ce secteur constituant un habitat favorable ou potentiel pour elle.
<p>J20 <i>Plan d'eau de la base de loisir et plan d'eau à proximité</i></p>	Moyenne	Sterne pierregarin	Secteur utilisé comme aire d'alimentation par l'espèce. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage.
<p>J21 <i>En site, partie nord, centre et sud de la boucle</i></p>	Moyenne	X	Secteurs conservant une sensibilité car à l'intérieur du périmètre du site Natura 2000.